



Gemeinsam gegen Problempflanzen - Bekämpfungsmassnahmen

Tabelle 1: Vorgehen und Zeitpunkt der Bekämpfung je vorkommender Neophyten-Art.

Artname (DE)	Taxon	Bewährte Massnahmen	Zeitpunkt	Hinweise/unwirksame Praktiken
Verlotscher Beifuss	<i>Artemisia verlotiorum</i>	<ul style="list-style-type: none">- Kleine Bestände samt Wurzeln ausreissen- Grössere Bestände (sofern Ausreissen nicht machbar): Blüten jährlich abschneiden und in Kehricht entsorgen oder wiederholtes bodenebenes Mähen (2x/Jahr)	Juli/August	
Neubelgische Aster	<i>Aster novi-belgii</i> aggr.	<ul style="list-style-type: none">- Kleine Bestände samt Wurzeln ausreissen (Vegetationsbeginn)- Grössere Bestände (sofern Ausreissen nicht machbar): jährlich mulchen und wiederholtes bodenebenes Mähen (3x/Jahr, Mai-August)	Vegetationsbeginn-August	
Schmetterlingsstrauch	<i>Buddleja davidii</i>	<ul style="list-style-type: none">- Junge Sträucher jährlich inkl. Wurzeln ausreissen und ggf. bodenebenes Mähen (2x/Jahr, April & September)- Grosse Sträucher fällen, Wurzeln ausgraben und entsorgen und ggf. bodenebenes Mähen (2x/Jahr)	April-September	
Glattes Zäckenschötchen	<i>Bunias orientalis</i>	<ul style="list-style-type: none">- Jährliches Ausstechen oder wiederholtes bodenebenes Mähen (2x/Jahr)	Mai-Juni	
Seidiger Hornstrauch	<i>Cornus sericea</i>	<ul style="list-style-type: none">- Alle Blüten jährlich abschneiden und in Kehricht entsorgen- Junge Sträucher jährlich inkl. Wurzeln ausreissen- Grosse Sträucher fällen, Wurzeln ausgraben und entsorgen	Vor der Blüte	
Korallenstrauch	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	<ul style="list-style-type: none">- Junge Sträucher jährlich inkl. Wurzeln ausreissen- Grosse Sträucher fällen, Wurzeln ausgraben und entsorgen	Vor April	

Einjähriges Berufskraut	<i>Erigeron annuus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamte Pflanze mehrmals jährlich sorgfältig und inkl. Wurzeln ausreissen 	Mai - September, vor Verblühen	<ul style="list-style-type: none"> - Mähen
Gestreiftes Süssgras	<i>Glyceria striata</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamte Pflanze inkl. Wurzeln ausreissen - Grosse Bestände: Kombination aus Mahd zu Saisonbeginn und anschliessenden Auftragens von geeignetem Herbizid auf die frisch gemähte Fläche 	Vor Samenreife	
Riesen-Bärenklau	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jährliches Mähen und anschliessendes Abstechen der Wurzeln (ca. 10-25cm unter Bodenoberfläche) 	April-Mai	Achtung: der Saft enthält Phototoxine und verursacht bei Kontakt und Sonneneinstrahlung Verbrennungen (bis 2. Grades). Es sind entsprechend Schutzmassnahmen notwendig. Allergiker sind zur Bekämpfung nicht geeignet.
Drüsiges Springkraut	<i>Impatiens glandulifera</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamte Pflanze sorgfältig und inkl. Wurzeln ausreissen oder bodenebenes Mähen im April mit Kontrolle nach 2 Wochen 	Juni- September, vor Verblühen	
Vielblättrige Lupine	<i>Lupinus polyphyllus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Bestände jährlich samt Wurzeln ausreissen - Grössere Bestände (sofern Ausreissen nicht machbar): Blüten jährlich abschneiden und in Kehricht entsorgen oder wiederholtes bodenebenes Mähen (2x/Jahr, Mai & Juli) 	Mai-Juli	
Gewöhnliche Jungfernebe	<i>Parthenocissus inserta</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Junge Sträucher und neue Triebe jährlich inkl. Wurzeln ausreissen - Grosse Sträucher fällen, Wurzeln ausgraben und entsorgen 	März-August	
Vieljähriger Knöterich	<i>Polygonum polystachyum</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Bestände: Gesamte Pflanze inkl. Wurzeln so oft wie möglich (mind. 7x/Jahr) ausreissen - Abtragung der Erde mit ca. 50cm Puffer um den Bestand - Bei grossen Beständen und ausserhalb von Gewässern: Mahd bei höchster Biomasse (Juni, kurz vor Blüte) und anschliessend neue Triebe 	April-Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Dämpfen - Mulchen - Abdeckung mit Plastik

		im August/September mit Herbizid behandeln (Zielort: Rhizome, nicht oberirdische Blätter)		
Kirschlorbeer	<i>Prunus laurocerasus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Junge Sträucher inkl. Wurzeln ausreissen und ggf. mähen (2x/Jahr, April & September) - Grosse Sträucher fällen, Wurzeln ausgraben und entsorgen 	März-August	
Staudenknöterich	<i>Reynoutria japonica</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Bestände: Gesamte Pflanze inkl. Wurzeln so oft wie möglich (mind. 7x/Jahr) ausreissen - Abtragung der Erde mit ca. 50cm Puffer um den Bestand - Bei grossen Beständen und ausserhalb von Gewässern: Mahd bei höchster Biomasse (Juni, kurz vor Blüte) und anschliessend neue Triebe im August/September mit Herbizid behandeln (Zielort: Rhizome, nicht oberirdische Blätter) 	April-Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Dämpfen - Mulchen - Abdeckung mit Plastik
Essigbaum	<i>Rhus typhina</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jungpflanzen: Pflanze jährlich inkl. Wurzeln ausreissen/ausgraben - Grosse Bäume: Ringeln (wenn kein Risiko von herabfallenden Ästen) oder fällen, Wurzeln ausgraben und entsorgen und neue Triebe bodeneben mähen 	März-August	Achtung: alle Teile und besonders der Milchsaft des Baums sind giftig, Kontakt mit Milchsaft verhindern. Allergiker sind zur Bekämpfung nicht geeignet.
Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jungpflanzen: Pflanze jährlich inkl. Wurzeln ausreissen/ausgraben - Grosse Bäume ringeln (nicht direkt fällen) 	März-August	
Armenische Brombeere	<i>Rubus armeniacus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamte Pflanze inkl. Wurzeln entfernen 	März-August	
Kaukasus-Fettkraut	<i>Sedum spurium</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jungtriebe regelmässig entfernen - Pflanzen ausgraben, was meist ein Abtrag des Bodens (inkl. Wurzeln) bedeutet 		<ul style="list-style-type: none"> - Mulchen und Pflügen
Ausläuferbildendes Fettkraut	<i>Sedum stoloniferum</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Jungtriebe regelmässig entfernen - Pflanzen ausgraben, was meist ein Abtrag des Bodens (inkl. Wurzeln) bedeutet 		<ul style="list-style-type: none"> - Mulchen und Pflügen
Südafrikanisches Greiskraut	<i>Senecio inaequidens</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamte Pflanze inkl. Wurzeln ausreissen (2x/Jahr, Mai & Juni) 	Mai-Juni	

Kanadische Gold- rute und Spätblü- hende Goldrute	<i>Solidago canadensis</i> <i>aggr.</i>	<ul style="list-style-type: none">- Gesamte Pflanze inkl. Wurzeln ausreissen (2x/Jahr, Mai & Juni)- Grössere Bestände (sofern Ausreissen nicht machbar): wiederholt (7x/Jahr) bodeneben Mähen und alle Blüten jährlich abschneiden und in Kehricht entsorgen	Mai-Novem- ber	
---	--	---	-------------------	--